

Neue Serica-Arten aus der orientalischen Region. (Col.)

Von J. Moser, Ellrich.

Autoserica sparsesetosa n. sp.

Oblongo-ovalis, brunnea, opaca, capite, prothorace scutello-que plerumque fulvis, elytris interdum nigris. Capite, fronte post suturam setis nonnullis vestita, clypeo subrugoso, sparsim erecte setoso; antennis 10-articulatis, flabello maris stipiti longitudine fere aequali, flabello feminae breviore; prothorace duplo latiore quam longiore, lateribus ciliatis, leviter curvatis, angulis anticis acutis, paulo productis, angulis posticis obtusis, subrotundatis, dorso setis nonnullis suberectis ornato; elytris leviter sulcatis, sulcis punctatis, punctis raris setis erectis, sat validis, vestitis, interstitiis fere impunctatis, elytrorum lateribus ciliatis; pygidio umbilicato-punctato, ante apicem setoso. Subtus pectore utrinque juxta medium setoso, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctis brevissime setosis, setis juxta coxarum latera validis; abdomine transversim setoso; femoribus posticis sat fortiter dilatatis, ante marginem posticum setis nonnullis validis instructis, tibiis posticis modice dilatatis et abbreviatis. — Long. 7,5 mm.

Mindanao (Surigao). Von Herrn Prof. C. F. Baker erhalten.

Autoserica siargaoensis n. sp.

A. eremita Brsk. similis et affinis. Nigro-fusca, opaca. Clypeo subrugoso-punctato antennis rufo-flavis, 9- vel 10-articulatis, flabello maris stipite paulo longiore, flabello feminae breviore; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus leviter curvatis, ciliatis, angulis anticis productis, angulis posticis obtusis, dorso mediocriter dense punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis perparum convexis, sat remote punctis minutissime setosis obtectis; pygidio sat sparsim punctato, ante apicem setoso. Pectore utrinque juxta medium setis vestito, pectoris lateribus coxisque posticis annulato-punctatis, punctis juxta coxarum latera setosis; abdominis segmentis juxta latera setis nonnullis instructis; femoribus posticis sat angustis, nitidis, post marginem anticum setosis, postice in parte apicali setis nonnullis vestitis; tibiis posticis parum dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 7 mm.

Philippinen (Siargao).

Etwas kleiner als *A. eremita* Brsk., der Fühlerfächer etwas länger, die Hinterbeine zwar ähnlich gebildet, die Borsten am Vorderrande die Hinterschenkel entspringen jedoch nicht wie bei

dieser Art aus einer zusammenhängenden, fein gestrichelten Linie, sondern aus einzelnen gestrichelten Querrissen.

Autoserica subaana n. sp.

♂. *A. anali* Brsk. similis, paulo minor, pygidio haud carinato. Rufa, opaca. Capite parce punctato, clypeo leviter rugoso, medio convexo; antennis rufo-flavis, 9-articulatis flabello maris stipite paulo longiore; prothorace transverso, lateribus leviter curvatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, subrotundatis, dorso sat remote punctato; elytris leviter sulcatis, sat sparsim punctatis, punctis minutissime setosis; pygidio parce punctato, postice setis nonnullis vestito. Subtus pectore utrinque juxta medium setoso, pectoris lateribus coxisque posticis mediocriter dense punctatis, punctis juxta coxarum latera setosis; abdominis segmentis lateraliter transversim setosis; femoribus posticis opacis, modice dilatatis, margine postico leviter sinuato; tibiis posticis modice dilatatis et abbreviatis. — Long. 5 mm.

Mindoro (Subaan). G. Boettcher leg.

Autoserica isarogensis n. s.

♂. Praecedenti similis, paulo major, femoribus posticis parum angustioribus, tibiis posticis longioribus. Rufa, opaca. Capite parce punctato, clypeo subrugoso, medio leviter convexo; antennis 9-articulatis, flabello maris stipite paulo longiore; prothorace postice fere duplo latiore quam longiore, antrorum angustato, lateribus setosis, angulis anticis porrectis, angulis posticis obtusis, rotundatis, margine antico medio levissime producto, dorso subtiliter punctato, punctis juxta prothoracis latera minutissime setosis; elytris leviter sulcatis, mediocriter crebre punctatis, punctis setis minimis instructis; pygidio umbilicato-punctato. Subtus pectore juxta medium setoso, pectoris lateribus coxisque posticis punctatis, coxis ante angulos posticos setis vestitis; abdomine transversim setoso; femoribus posticis paulo dilatatis, post marginem anticum breviter dense strigillatis et brevissime setosis, margine postico levissime sinuato; tibiis posticis paulo dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 6 mm.

Luzon (Mt. Isarog). G. Boettcher leg. 8. IV. 1916.

Autoserica kasigurana n. sp.

♂. *A. subaanae* similis, antennarum flabello maris breviore. Rufa, opaca. Capite, fronte parce, clypeo densius punctato et leviter rugoso, clypei medio convexo; antennis 9-articulatis flabello maris stipiti longitudine aequali; prothorace transverso, lateribus curvatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis,

rotundatis, dorso mediocriter crebre punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis leviter convexis, sat sparsim punctatis, punctis minutissime setosis; pygidio remote punctato. Pectore juxta medium setoso, pectoris lateribus coxisque posticis sat dense umbilicato-punctatis, punctis juxta coxarum latera setis vestitis; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis modice dilatatis, tibiis posticis paulo dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 6 mm.

Luzon (Kasiguran). G. Boettcher leg. VIII. 1915.

Autoserica fasciculata n. sp.

♂. *A. nigrorubrae* Brsk. similis. Opaca, supra nigrofusca, subitus rufofusca. Capite, fronte subtiliter, clypeo subrugoso-punctato, clypei medio longitudinaliter subcarinato; antennis rufo-flavis, 10-articulatis, flabello maris stipite parum longiore; prothorace plus duplo latiore quam longiore, lateribus leviter curvatis, setosis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, margine antico medio parum producto, dorso dense subtiliter punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, mediocriter crebre punctatis, punctis minutissime setosis; pygidio sat crebre umbilicato-punctato, ante apicem setis raris instructo. Subtus pectore in parte postica fasciculis duobus, e setis flavis compositis, ornato, pectoris lateribus coxisque posticis dense umbilicato-punctatis, abdomine transversim setoso; femoribus posticis latis, ante marginem posticum setosis; tibiis posticis fortiter dilatatis et abbreviatis. — Long. 9 mm.

Luzon (Montalban). G. Boettcher leg.

Die Art, welche der *nigrorubra* Brsk. sehr ähnlich ist, zeichnet sich dadurch aus, daß sich die Borsten beiderseits der Mitte der Brust hinten zu Borstenbüscheln verdichten.

Neoserica brevicollis n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, supra rufofusca, subitus testacea, opaca. Capite, fronte indistincte punctata, clypeo leviter rugoso; antennis 10-articulatis, flabello maris 4-articulato, stipiti longitudine aequali; prothorace valde transverso, lateribus curvatis, angulis anticis porrectis, acutis, angulis posticis obtusis, rotundatis, margine antico medio producto, dorso sat crebre punctato, punctis minutissime setosis; elytris leviter sulcatis, mediocriter dense punctatis, punctis setis minutis vestitis, elytrorum lateribus ciliatis; pygidio levissime rugoso, umbilicato-punctato, punctis setis minutissimis, ante pygidii apicem setis longis instructis. Subtus pectore juxta medium erecte setoso, pectoris lateribus coxisque

posticis punctatis, punctorum setis minutis, in pectoris parte anteriore et juxta coxarum latera sat validis; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis opacis, modice dilatatis, ante marginem posticum setosis; tibiis posticis nec dilatatis, nec abbreviatis. — Long. 11 mm.

Sumatra (Pick v. Korintzi). Brünnemeyer leg. VI. 1920.

Neoserica siantarensis n. sp.

♂. *N. soekerandanae* Brsk. similis, sed tibiis posticis angustioribus et longioribus. Opaca, supra fusca, subtus brunnea. Capite sat subtiliter punctato, clypei medio leviter convexo; antennis fulvis, flabello maris 4-articulato, stipiti longitudine aequali; prothorace transverso, lateribus ciliatis, angulis anticis porrectis, angulis posticis rotundatis, margine antico medio leviter producto, dorso mediocriter crebre punctato, punctis setis minutis ornatis; elytris seriato-punctatis, interstitiis paulo convexis, sat remote punctis obtectis, punctis minutissime setosis, elytrorum lateribus ciliatis; pygidio umbilicato-punctato, punctis setis minutis, ante apicem setis nonnullis instructis; tibiis posticis modice dilatatis et modice abbreviatis. — Long. 9 mm.

Sumatra (Siantar). J. B. Corporaal leg.

Das einzige vorliegende Exemplar wurde mir gütigst überlassen.

Neoserica brastagiensis n. sp.

N. rufulae Mos. similis, femoribus posticis minus dilatatis. Castanea, nitida. Capite dense subrugoso-punctato, vertice laevi; antennis fulvis, flabello maris 4-articulato, stipiti longitudine aequali; prothorace postice duplo latiore quam longiore, antrorsum angustato, lateribus curvatis, ciliatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, margine antico medio producto, dorso sat crebre punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis leviter convexis, mediocriter dense punctis obtectis, lateribus setosis; pygidio sat remote punctato, apice longe piloso. Subtus pectore juxta medium setoso, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, coxis juxta latera setis vestitis; abdomine transversim setoso; femoribus posticis modice dilatatis, post marginem anticum et ante marginem posticum setis nonnullis instructis; tibiis posticis nec dilatatis, nec abbreviatis. — Long. 9 mm.

Sumatra (Brastagi). J. B. Corporaal leg.

Neoserica butuana n. sp.

♂. *N. makilingicae* Mos. similis, sed femoribus posticis nitidis. Nigro-fusca, opaca, pedibus nitidis. Capite sparsim punctato, clypei medio leviter convexo, margine antico elevato, medio paulo producto; antennis rufo-flavis, flabello maris 4-articulato, stipiti longitudine fere aequali, flabelli articulo primo paulo abbreviato; prothorace transverso, lateribus setosis, angulis posticis fere rectangulis, angulis anticis acutis, productis, dorso subtiliter punctato, punctis minutissime setosis; elytris leviter striatis, intersticiis parum convexis, umbilicato-punctatis, punctis setis minimis vestitis; pygidio punctato, ante apicem setoso. Pectore juxta medium erecte setoso, pectoris lateribus coxisque posticis umbilicato-punctatis, punctorum setis minutis, juxta coxarum latera validis, abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis parum modo dilatatis, ante apicem una seta instructis, tibiis posticis paulo dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 11 mm.

Mindanao (Butuan). C. F. Baker leg.

Neoserica armata n. sp.

N. uncinatae Brsk. similis et affinis, differt: antennarum flabello paulo longiore, tibiis posticis angustioribus et longioribus. Fusca, opaca. Capite, clypeo subrugoso-punctato, medio leviter convexo, fronte sparsim punctata; antennis ferrugineis, flabello maris 4-articulato, stipite longiore, flabelli feminae 3-articulato, stipite paulo breviore; prothorace postice fere duplo latiore quam longiore, lateribus ciliatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis rotundatis, margine antico medio leviter producto, dorso subtiliter punctato; elytris leviter sulcatis, mediocriter crebre punctatis, elytrorum lateribus ciliatis; pygidio umbilicato-punctato, ante apicem setoso. Subtus pectore juxta medium erecte setoso, pectoris lateribus coxisque posticis leviter rugosis, sat dense annulato-punctatis, punctis juxta coxarum latera setis vestitis; abdome transversim setoso; femoribus posticis modice dilatatis, margine postico medio spinoso, spina in femina parva; tibiis posticis parum dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 12 mm.

Luzon (Mt. Banahao). G. Boettcher leg. IV. 1916.

Neoserica denticulata n. sp.

N. uncinatae Brsk. affinis, differt: antennarum flabello in mare paulo breviore, flabelli articulo primo plus minusve abbreviato femoribus posticis margine postico in parte apicali minus sinuato, tibiis posticis parum latioribus et brevioribus. — Long. 9 mm.

Philippinen: Bucas Grande (Socorro). G. Boettcher leg. X. 1916.

Neoserica mucronata n. sp.

N. uncinatae Brsk. affinis, differt: femoribus posticis in marge dente marginali multo longiore et leviter curvato. — Long. 9 mm.
Masbate (Arorog). G. Boettcher leg. IX. 1917.

Microserica hobokoana n. sp.

♂. Oblongo-ovalis, nigra, opaca. Capite, fronte opaca, post suturam setosa, clypeo sat remote punctato, punctis setis erectis vestitis; antennis piceis, flabello maris 5-articulato, stipiti longitudine subaequali; prothorace postice fere duplo latiore quam longiore, antrorum angustato, lateribus setosis, postice fere rectis, antice incurvatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, breviter rotundatis, dorso mediocriter crebre punctato, punctis minutissime setosis, post angulos anticos setis validis instructo; elytris leviter sulcatis, mediocriter crebre punctis brevissime setosis obtectis, elytrorum lateribus setis sat validis ciliatis; pygidio subtiliter punctato, juxta latera setoso. Subtus pectore utrinque juxta medium setis vestito, pectoris lateribus coxisque posticis haud dense punctatis, punctis setis minutis, juxta coxarum latera setis validis instructis; abdomine transversim setoso; femoribus tibiisque posticis paulo dilatatis, illis ante marginem posticum setosis, margine postico in dimidia parte apicali leviter sinuato. — Long. 5,5 mm.

Sumatra (Hoboko). A. J. Garretsen leg.

Microserica variicornis n. sp.

♂. *M. singalangiae* Brsk. simillima, differt antennarum flabelli maris breviore, flabelli articulo primo abbreviato, elytrorum intersticiis planis. — Long. 4,5 mm.

Sumatra (Pangheranz-Pisang). Modigliani leg.

Brenske hat die Exemplare von Pangherang-Pisang mit denen von Singalang vereinigt. Der Fühlerfächter des ♂ ist jedoch bei *singalangiae* so lang wie der Stiel und das erste Fächerglied ist nicht verkürzt. Bei *variicornis* dagegen ist der Fühlerfächter kürzer als der Stiel und das erste Glied ist kürzer. Die Zwischenräume der Punktreihen der Flügeldecken sind flach, bei *singalangiae* etwas gewölbt.

Microserica variicollis n. sp.

M. singalangiae Brsk. simillima, differt: prothorace postice attenuato. — Long. 4,5 mm.

Sumatra (Lan Rakit). J. B. Corporaal leg. VI. 1918.

Auch diese Art ist der *M. singalangiae* Brsk. sehr ähnlich, die Seitenränder des Halsschildes sind jedoch mehr gekrümmmt

und das Halsschild daher hinten etwas verjüngt, bei *singalangia* verbreitert. Der Fühlerfächer des ♂ ist ebenso gebildet wie bei *singalangia*.

Microserica iridicolor n. sp.

♂. *M. singalangiae* Brsk. simillima, differt: parum major, antennarum flabello maris paulo breviore, flabelli articulo primo paulo abbreviato, prothoracis lateribus postice parallelis, levissime sinuatis, elytrorum interstitiis fere planis. — Long. 5 mm.

Sumatra (Brastagi). J. B. Corporaal leg. V. 1918.

Diese Art ist ein wenig größer als *singalangia*, oberseits stark irisierend. Der Fühlerfächer ist ebenso gebildet wie bei *variicornis*, das Halsschild ist nicht wie bei *singalangia* hinten schwach verbreitert, sondern die Seitenränder sind parallel und ein wenig gebuchtet. Die Zwischenräume zwischen den Punktreihen der Flügeldecken sind fast flach.

Microserica sitoliensis n. sp.

M. pulchellae Brsk. simillima, differt: prothoracis angulis anticus minus productis. — Long. 4,5 mm.

Nias (Goenoeng Sitoli). R. Mitschke et J. Z. Kannegieter leg.

Die Art ist den matten Exemplaren der *M. pulchella* Brsk. täuschend ähnlich, unterscheidet sich aber durch die Form des Halsschildes, indem die Vorderecken weniger vorgezogen sind. Auch ist der Forceps anders gebildet.

Microserica Dohrni Brsk. (= *recondita* Brsk.).

Herr Prof. Krüger in Stettin war so liebenswürdig, mir aus dem Stettiner Museum die typischen Exemplare von *M. Dohrni* Brsk. zur Untersuchung zu schicken. Der ♂ dieser Art hat nicht, wie Brenske angibt, einen 4blättrigen, sondern einen 5gliedrigen Fühlerfächer und fällt die Art wohl sicher mit *recondita* Brsk.. von der ich ein typisches ♀ besitze, zusammen.

Microserica suavidica Brsk.

Auch diese Art erhielt ich von Herrn Prof. Krüger zugesandt und konnte feststellen, daß der Fühlerfächer des ♂ nicht 4-, sondern 5gliedrig ist.

Microserica binaluana n. sp.

M. palawanae Brsk. simillima et affinis, differt: tibiis posticis paulo longioribus. Rufo-fulva, opaca, elytrorum sutura lateribusque infuscatis, capite prothoraceque viridescentibus. Capite parce punctato, punctis majoribus erecte setosis; antennis fulvis, flabello maris 4-articulato, stipiti longitudine aequali, flabello feminae

3-articulato, stipite breviore; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus curvatis, ciliatis, angulis anticis productis, acutis, angulis posticis obtusis, dorso subtiliter punctato; elytris leviter sulcatis, sulcis dense, interstitiis sparsissime punctatis, punctis minutissime setosis; pygidio mediocriter crebre punctis obtecto. Subtus pectore remote punctato, utrinque juxta medium setoso, coxis posticis densius punctatis, juxta latera setis instructis; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis fortiter dilatatis, tibiis posticis parum dilatatis et parum abbreviatis. — Long. 4,5—5 mm.

Palawan (Binaluan). G. Boettcher leg.

Microserica difficilis n. sp.

♂. Praecedenti simillima, paulo major, femoribus posticis parum latioribus, tibiis posticis parum longioribus. — Long. 5,5—6 mm.

Palawan (Binaluan). G. Boettcher leg.

Die Art ist der vorhergehend beschriebenen täuschend ähnlich und bildet die gleichen Farbenvarietäten. Sie ist durchschnittlich etwas größer, die Hinterschenkel sind kaum merklich breiter, die Hinterschienen ein wenig länger. Der Forceps ist anders gebildet, wodurch die ♂ leicht zu unterscheiden sind, während ich die weiblichen Exemplare beider Arten nicht von einander trennen kann.

Microserica balabacensis n. sp.

♂. Praecedentibus similis, differt: antennarum flabello maris longiore, leviter curvato. Opaca, fusca, fronte viridi, prothorace viridescente, elytris rufis. Capite sat remote punctato, fronte setis nonnullis vestita; antennis ferrugineis, flabello maris 4-articulato, stipite paulo longiore; prothorace transverso, lateribus margineque antico setosis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, dorso subtiliter punctato, punctis minutissime setosis; elytris sulcatis, sulcis obscuratis, punctatis, interstitiis fere laevibus; pygidio irregulariter punctato. Subtus ab domine transversim setoso, femoribus posticis sat fortiter dilatatis, margine postico in parte apicali sinuato, ante marginem posticum setis nonnullis instructis; tibiis posticis modice dilatatis, sat fortiter abbreviatis. — Long. 4,5 mm.

Balabac. Waterstradt leg.

Microserica sibuyana n. sp.

M. samaranae Brsk. similis, differt: femoribus posticis latioribus. Opaca, rufa, prothorace interdum viridi, vel ubique nigro-viridis. Capite parce punctato, clypeo sparsim setoso, post

marginem anticum laevi; antennis rufo-flavis, flabello maris 4-articulato, stipite multo longiore, leviter curvato, flabello feminae 3-articulato, stipite breviore; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus ciliatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, dorso subtiliter punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis leviter convexis, remote punctis obtectis; pygidio parce punctato, in femina postice nitido; abdominis segmentis transversim setosis; femoribus posticis sat fortiter dilatatis, margine postico in parte apicali leviter sinuato; tibiis posticis paulo dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 5 mm.

Philippinen: Ins. Sibuyan. C. F. Baker leg.

Microserica balbalana n. sp.

M. samaranae Brsk. similis, differt: femoribus posticis nitidis. Opaca, rufa, fronte, prothoracis medio et elytrorum sutura lateribusque interdum nigro-viriaibus. Capite, fronte parce, clypeo rugoso-punctato, clypei medio convexo; antennis ferrugineis, flabello maris 4-articulato, stipite longiore, leviter curvato, flabello feminae 3-articulato, stipiti longitudine aequali; prothorace dimidia parte latiore quam longiore, lateribus ciliatis, angulis anticis acutis, porrectis, angulis posticis obtusis, dorso subtiliter punctato; elytris seriato-punctatis, interstitiis leviter convexis, parce punctis obtectis; pygidio sparsim punctato, in femina nitido; abdomine transversim setoso; femoribus posticis paulo dilatatis, postice parce setosis, margine postico sinuato; tibiis posticis paulo dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 5 mm.

Luzon (Balbalan). G. Boettcher leg. I. 1918.

Microserica calapana n. sp.

M. samaranae Brsk. affinis, major, flabello maris paulo breviore. Opaca, supra rufa, fronte prothoraceque plerumque, interdum etiam scutello viridibus, subtus fusca. Capite parce punctato, clypeo levissime rugoso, medio convexo; antennis rufo-flavis, flabello maris 4-articulato, stipite longiore, flabello feminae 3-articulato, stipite breviore; prothorace antrorsum angustato, lateribus ciliatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, dorso sat crebre subtiliter punctato; elytris leviter sulcatis, sulcis punctatis, interstitiis fere laevibus; pygidio parce punctato, pygidii medio in femina nitido. Subtus abdominis segmentis transversim setosis, femoribus posticis modice dilatatis, margine postico in parte apicali sinuato, tibiis posticis paulo dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 6 mm.

Mindoro (Calapan). G. Boettcher leg. II. 1916.

Microserica viridifrons n. sp.

M. samaranae Brsk. similis, praecipue differt: antennarum flabello in mare paulo breviore, haud curvato. Rufa, opaca, fronte viridi. Capite sparsissime setoso, fronte subtiliter punctata, clypeo subrugoso, medio leviter convexo; antennis rufis, flabello maris 4-articulato, stipite paulo longiore; prothorace postice fere duplo latiore quam longiore, lateribus setosis, angulis anticis productis, angulis posticis obtusis, dorso sat crebre subtiliter punctato; elytris leviter sulcatis, sulcis punctatis, plus minusve nigrescentibus, interstitiis sparsim punctis obtectis; pygidio umbilicato-punctato, ante apicem eructe setoso. Subtus abdomine transversim setoso, femoribus posticis modice dilatatis ante marginem posticum setis nonnullis ornatis, tibiis posticis paulo dilatatis et parum abbreviatis. — Long. 5 mm.

Masbate (Arorog). G. Boettcher leg. VIII. 1917.

Microserica kolambugana n. sp.

♂. Praecedenti similis, antennarum flabello maris paulo breviore, femoribus posticis paulo latioribus. Opaca, supra rufa, fronte viridi, prothorace in parte anteriore viridescente, subtus fusca. Capite mediocriter crebre punctato, clypeo subrugoso, medio convexo, antennarum flabello maris 4-articulato, stipite paulo longiore; prothorace dimidia parte latiore quam longiore lateribus margineque antico setosis, dorso subtiliter punctato; elytris leviter sulcatis, sulcis punctatis, obscuratis, interstitiis remote punctis obtectis; pygidio irregulariter punctato. Subtus abdomine transversim setoso, femoribus posticis sat fortiter dilatatis, postice setis nonnullis vestitis, margine postico in parte apicali levissime sinuato; tibiis posticis paulo dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 5 mm.

Mindanao (Kolambugan). C. F. Baker leg.

Microserica dansalana n. sp.

♂. *M. abbreviatae* Brsk. similis, differt: antennarum flabello maris articulo primo abbreviato. Rufa, opaca, fronte prothoracisque medio viridibus. Capite parce punctato, clypeo sparsim setoso, antice fere laevi; antennis rufo-flavis, flabelli articulo primo fortiter abbreviato; prothorace transverso, lateribus ciliatis, angulis anticis acutis, productis, angulis posticis obtusis, dorso mediocriter crebre punctato; elytris leviter sulcatis, sulcis punctatis, interstitiis fere laevibus; pygidio parce punctato. Subtus abdomine transversim setoso, femoribus posticis modice dilatatis, margine postico in

parte apicali sinuato; tibiis posticis paulo dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 5 mm.

Mindanao (Dansalan). G. Boettcher leg. II. 1915.

Microserica mindoroana Brsk.

Bei der Beschreibung hat Brenske, wie sich aus der Forcepsbildung ergibt, 2 Arten vor sich gehabt. Die eine Art hat einen 5gliedrigen Fühlerfächter, die andere einen 6gliedrigen, bei dem das erste Glied mehr oder weniger verkürzt ist. Letztere Art findet sich allein unter den typischen Exemplaren der coll. Brenske und behalte ich daher für diese den Namen *mindoroana* bei, während ich die andere Art nachstehend beschreibe. Beide Arten zeichnen sich durch eine starke, fast büschelförmige Beborstung des Abdomens aus.

Microserica theodoroensis n. sp.

M. mindoroanae Brsk. similis, paulo major, antennarum flabello maris 5-articulato, stipite multo longiore, leviter curvato, flabelli articulo primo plus minusve abbreviato. — Long. 6 mm.

Mindoro (San Theodoro, Subaan). G. Boettcher leg. I. 1916.

Microserica arorogensis n. sp.

♂. Praecedenti similis, paulo minor, abdomine in mare haud dense et fortiter setoso. Opaca, capite, prothorace scutelloque viridibus, plus minusve rufescentibus, elytris rufis, elytrorum lateribus nigrescentibus, subtus fusca vel viridi-fusca. Capite mediocriter crebre punctato, clypeo transversim setoso, medio parum convexo, antennis rufo-flavis, flabello maris 5-articulato, stipitis articulo tertio paulo elongato, articulo quinto spinoso; prothorace fere duplo latiore quam longiore, lateribus setosis, angulis anticis productis, angulis posticis obtusis, dorso subtiliter punctato; elytris leviter sulcatis, sulcis infuscatis, medio-criter dense punctatis, punctis minutissime setosis; pygidio umbilicato-punctato, ante apicem setoso. Subtus abdomine transversim setoso, femoribus posticis modice latis, ante marginem posticum setis nonnullis instructis, tibiis posticis paulo dilatatis et paulo abbreviatis. — Long. 4—4,5 mm.

Masbate (Arorog). G. Boettcher leg. VIII. 1917.

Trioserica n. gen.

Antennae 10-articulatae, antennarum flabellum maris 3- vel 4-articulatum. Tibiae anticae tridentatae, femora postica ad apicem versus sat fortiter angustata. Elytra sparsim squamis parvis vel setis squamiformibus ornata.

In diese Gattung gehören *Neoserica squamuligera* Mos., *Neoserica longiclava* Mos., *Periserica zamboangensis* Mos. und die nachfolgend beschriebenen Arten.

Trioserica sparsesquamosa n. sp.

T. longiclavae Mos. simillima, differt: colore, fronte viridi excepta, lurida, antennarum flabello maris fortius elongato, stipite plus duplo longiore, elytris haud sparsim setosis, sed parce squamosis; antennarum flabello feminae 3-articulato, stipiti longitudinaliter aequali. — Long. 5 mm.

Mindanao (Surigao, Iligan). C. F. Baker leg.

Trioserica lepichaeta n. sp.

Praecedenti similis, differt: colore paulo obscuriore, antennarum flabello maris parum breviore, prothoracis lateribus fortius curvatis, elytrorum squamis angustioribus. — Long. 5—5,5 mm.

Mindoro (Subaan). G. Boettcher leg. II. 1916.

Trioserica trifoliata n. sp.

♂. *T. zamboangensi* Mos. similis, differt: antennarum flabello maris paulo breviore, 3-articulato. — Long. 4,5—5,5 mm.

Mindanao (Butuan). C. F. Baker leg.
